

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
☎ (73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

N°20

Le 20 Juin 1984

CHANGEMENT D'ADRESSE

*A compter du 28 Juin 1984, la nouvelle adresse de l'Antenne
du LIMOUSIN sera la suivante :*

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Antenne du LIMOUSIN
19, boulevard de la Corderie
87000 LIMOGES
Tél. (55) 32.13.80

CARPOCAPSE DES POMMES, DES POIRES ET DES NOIX

Le vol est actuellement important en tous secteurs.

Les éclosions en cage d'élevage se poursuivent.

Compte tenu des conditions climatiques actuelles, les premières chenilles vont bientôt apparaître.

* PRECONISATIONS

- Vergers traités au DIMILIN

Le traitement a dû être réalisé (préconisations du précédent bulletin).

- Vergers traités avec un produit larvicide

Intervenir dès réception du bulletin.

MINEUSE CERCLEE

De nombreux oeufs ont été déposés.

Les préconisations du précédent bulletin restent valables.

P.3.16

TAVELURE

On peut appliquer la stratégie définie dans le bulletin précédent.

- Vergers indemnes de tavelure

Arrêter la protection tout en effectuant des observations régulières pour déceler l'apparition d'éventuelles taches.

- Vergers avec des taches

Maintenir une protection régulière jusqu'à la récolte.

ATTENTION : de nombreux vergers présentent des taches.

PSYLLE DU POIRIER

De nombreux oeufs ont été déposés depuis le 9 Juin.
Les éclosions ont débuté.

Intervenir si nécessaire : *préférer l'amitraz*

BLE

Stades

(AUVERGNE : début floraison (10-5-1)
)
(à fin floraison (10-5-3)
)
(LIMOUSIN : fin floraison (10-5-3)
)
(à grain laiteux (11-1)
)

MALADIES

Des pustules de Rouille brune sont observées dans quelques parcelles sur TALENT et CAMP-REMY.

Cette maladie est à surveiller particulièrement sur les blés les plus tardifs.

Le seuil d'intervention se situe à l'apparition des premières pustules sur la F2.

INSECTES

. Pucerons des épis

Depuis notre dernier bulletin, on constate une évolution des populations de pucerons avec l'apparition des fortes chaleurs. Les infestations peuvent être localement importantes. La multiplication de ces insectes peut être très rapide. Une visite régulière de vos parcelles s'impose jusqu'au stade grain-laiteux (11-1).

Intervenir dès que le seuil de 1 épi sur 2 colonisé est atteint.

Choisir un insecticide autorisé non dangereux pour les abeilles.

.../...

| MATIERES ACTIVES | SPECIALITES COMMERCIALES | DOSES |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| pyrimicarbe | PIRIMOR G | 0,25 kg |
| phosalone | ZOLONE liquide ZOLONE flo AZOFENE flo | 1,75 l 1,20 l 1,20 l |
| bromophos | NEXION EC 40 SOVI NEXION 25 émulsion RHODIANEX | 1,00 l 1,50 l 1,50 l |
| endosulfan | THIODAN 35 CE | 1,50 l |
| dialiphos + endosulfan | FENDIK | 1,50 l |
| thiométon + endosulfan | SERK | 1,50 l |
| éthiophencarbe + oxydéméton méthyl | CRONETON MR | 1,00 l |
| fenvalérate | SUMICIDIN 10 | 0,35 l* |
| deltaméthrine | DECIS | 0,25 l* |

* Non dangereux pour les abeilles dans les conditions d'emploi prescrites (respectez scrupuleusement les doses).

CECIDOMYIES

Dans le PUY-DE-DOME et dans l'ALLIER, les captures de Cécidomyies orange deviennent plus importantes.

Soyez vigilant, les blés à la floraison sont sensibles à ces insectes.

En présence de pucerons, il est interdit d'utiliser les produits à base de fénitrothion.

MAIS

PYRALE

La nymphose des chenilles a débuté le 19 Juin dans notre cage d'élevage de MARMILHAT.
Il est recommandé de brûler les résidus de rafles de vos cribs à maïs rapidement.
La note jointe fait le point sur la lutte contre la pyrale du maïs.

La nymphose des chenilles a débuté le 19 Juin dans
Il est recommandé de brûler les résidus de rafles
La note jointe fait le point sur la lutte contre

NOTE TECHNIQUE 1984

=====

ACTA - INRA - AGPM - SPV

P Y R A L E D U M A Ï S

La lutte contre la Pyrale du Maïs à l'aide d'insecticides microgranulés, appliqués à un stade optimum, doit rester la méthode de base.

Au cours des dernières campagnes, les travaux réalisés ont en effet montré qu'il existait une relation, dans certaines situations, entre l'application de pyréthrinoides liquides et les pullulations de pucerons (*Rhopalosiphum padi*, essentiellement).

Plusieurs formulations liquides (DECIS, SUMICIDIN, CYMBUSH, KAFIL SUPER et RIPCORDER 5 ont reçu une autorisation provisoire de vente en 1983, l'attention des utilisateurs doit être attirée sur les pullulations de pucerons qu'elles risquent d'entraîner.

L'emballage des spécialités en cause porte d'ailleurs une mention à cet égard.

* * * * *